

## C07

## QUIMICA ORGANICA [2]

## C07K

**PEPTIDOS** (péptidos que contienen  $\beta$ -anillos lactamas C07D; ipéptidos cíclicos que no tienen en su molécula ningún otro enlace peptídico más que los que forman su ciclo, p. ej. piperazina diones-2,5, C07D; alcaloides del cornezuelo del centeno de tipo péptido cíclico C07D 519/02; proteínas monocelulares, enzimas C12N; procedimientos de obtención de péptidos por ingeniería genética C12N 15/00) [4]

- (1) En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:
- “aminoácidos” son compuestos en los que al menos un grupo amino y al menos un grupo carboxilo están unidos a la misma estructura carbonada, pudiendo formar parte de un ciclo el átomo de nitrógeno del grupo amino;
  - “enlace peptídico normal” es un enlace entre un grupo alfa-amino de un aminoácido y el grupo carboxilo  $\pi$ -en posición 1-de otro alfa-aminoácido;
  - “enlace peptídico anormal” es aquel en el que al menos uno de los aminoácidos implicados no es un alfa-aminoácido, o un enlace formado por al menos un grupo carboxilo o amino de la cadena lateral de un alfa-aminoácido;
  - “péptidos” son compuestos que contienen por lo menos dos unidades de aminoácidos, que están unidas por al menos un enlace peptídico normal, incluyendo oligopéptidos, polipéptidos y proteínas, donde
    - (i) “péptidos lineales” pueden contener ciclos formados por enlaces **S-S**, o por un grupo hidroxilo o mercapto de un hidroxilo- o de un mercapto-aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido (p. ej. péptidos lactónicos) pero no comprendiendo ciclos formados solamente por enlaces peptídicos;
    - (ii) “péptidos cíclicos” son péptidos que contienen al menos un ciclo formado solamente por enlaces peptídicos; la ciclación sólo puede hacerse por enlaces peptídicos normales o anormales, p. ej. por el grupo amino-4 del ácido diamino-2,4 butanoico. Por tanto, los compuestos cíclicos en los que al menos un enlace en el ciclo es un enlace no peptídico, se consideran como “péptidos lineales”;
    - (iii) “depsipéptidos” son compuestos que contienen una secuencia de al menos dos alfa-aminoácidos y al menos un ácido alfa-hidroxil-carboxílico, unidos por al menos un enlace peptídico normal y un enlace éster, derivados de estos ácidos hidroxicarboxílicos, en los que
      - (a) “depsipéptidos lineales” pueden contener ciclos formados por enlaces **S-S**, o por un grupo hidroxilo o mercapto de un hidroxilo- o de un mercapto-aminoácido y el grupo carboxilo de otro amino- o hidroxil-ácido, pero no contienen ciclos formados solamente por enlaces peptídicos o éster derivados de ácidos hidroxicarboxílicos, p. ej. **Gly-Ala-Gly-OCH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H** y **Gly-OCH<sub>2</sub>CO-Ala-Gly** se consideran como “depsipéptidos lineales”, pero **HOCH<sub>2</sub>CO-Gly-Ala-Gly** que no contiene enlace éster es por tanto un derivado de **Gly-Ala-Gly** que está previsto en C07K 5/08;
      - (b) “depsipéptidos cíclicos” son péptidos que contienen al menos un ciclo formado solamente por enlaces peptídicos o éster,  $\pi$ -derivados de ácidos hidroxicarboxílicos  $\pi$ , p. ej.
- ; [4]
- (iv) “péptidos híbridos” son péptidos producidos por fusión o unión covalente de dos o más péptidos heterólogos.
- (2) **Es** importante tener en cuenta la Nota (3) después de la clase C07, la cuál establece que la regla de prioridad del último lugar se aplica entre las subclases C07C Hasta C07K y dentro de estas subclases. [8]
- (3) **La** actividad terapéutica de los compuestos se clasifica además en la subclase A61P. [7]
- (4) Cuando se clasifique en esta subclase, también se clasifica en el grupo B01D 15/08 si materia de interés general relativa a cromatografía está concernida. [8]
- (5) Los fragmentos de péptidos o péptidos modificados por eliminación o adición de aminoácidos, por sustitución de unos aminoácidos por otros, o por combinación de estas modificaciones son clasificados como los péptidos de los que proceden. Sin embargo, los fragmentos peptídicos que sólo tienen cuatro aminoácidos o menos son también clasificados en el grupo C07K 5/00. [6]
- (6) Los péptidos obtenidos mediante procedimientos químicos y con una secuencia aminoácida derivada de péptidos de origen natural son clasificados con el péptido natural. [6]
- (7) Los péptidos obtenidos mediante tecnología de ADN recombinante no son clasificados según el huésped, sino de acuerdo con el péptido expresado originalmente, p. ej. el péptido **VIH** expresado en *E. coli* se clasifica con los péptidos **VIH**. [6]

**Esquema general**

## PEPTIDOS

Preparación .....	1/00
de un número de indeterminado de aminoácidos.....	2/00
Hasta 20 aminoácidos en una secuencia indeterminada o sólo parcialmente determinada.....	4/00
Hasta 20 aminoácidos en una secuencia totalmente determinada .....	5/00 Hasta 9/00

Depsipéptidos de hasta 20 aminoácidos en una secuencia totalmente determinada .....	11/00
Con más de 20 aminoácidos .....	14/00
Inmunoglobulinas.....	16/00
Péptidos unidos a un transportador (“carrier”) o inmovilizados.....	17/00
Péptidos híbridos.....	19/00

<b>1/00</b>	<b>Procedimientos generales de preparación de péptidos [4]</b>
1/02	. en solución [4]
1/04	. sobre soportes [4]
1/06	. utilizando grupos protectores o agentes de activación [4]
1/08	. . utilizando agentes de activación [4]
1/10	. utilizando agentes de acoplamiento [4]
1/107	. por modificación química de los péptidos precursores [6]
1/113	. . sin cambio de la estructura primaria [6]
1/12	. por hidrólisis [4]
1/13	. Marcaje de péptidos [6]
1/14	. Extracción; Separación; Purificación [4,6]
1/16	. . por cromatografía [6]
1/18	. . . Cromatografía de intercambio iónico [6]
1/20	. . . Cromatografía de partición, fase inversa o hidrófoba [6]
1/22	. . . Cromatografía de afinidad o técnicas análogas basadas en procesos de absorción selectiva [6]
1/24	. . por medios electroquímicos [6]
1/26	. . . Electroforesis [6]
1/28	. . . . Focalización isoelectrica [6]
1/30	. . por precipitación [6]
1/32	. . . en forma de complejos [6]
1/34	. . por filtración, ultrafiltración u ósmosis inversa [6]
1/36	. . por una combinación de varios procesos de diferentes tipos [6]
<b>2/00</b>	<b>Péptidos con un número indeterminado de aminoácidos; Sus derivados [6]</b>
<b>4/00</b>	<b>Péptidos con hasta 20 aminoácidos en una secuencia indeterminada o sólo parcialmente determinada; Sus derivados [6]</b>
4/02	. de virus [6]
4/04	. de bacterias [6]
4/06	. de hongos [6]
4/08	. de algas; de líquenes [6]
4/10	. de vegetales [6]
4/12	. de animales; de humanos [6]
<b>5/00</b>	<b>Péptidos con hasta cuatro aminoácidos en una secuencia totalmente determinada; Sus derivados [4]</b>

### Nota

En el presente grupo, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado: [6]  
 – “primer aminoácido” significa el primero empezando por la izquierda, es decir, el aminoácido N-terminal de la secuencia peptídica. [6]

5/02	. que contienen al menos un enlace peptídico anormal [4]
5/023	. . que contienen al menos un beta-aminoácido [6]
5/027	. . que contienen al menos un gamma-aminoácido, p. ej. estatina [6]
5/03	. . que contienen al menos un delta-aminoácido, p. ej. isósteres [6]
5/033	. . que contienen al menos un epsilon o un zeta-aminoácido [6]
5/037	. . el enlace anormal lo forma la cadena lateral de un alfa-aminoácido, p. ej. gamma-Glu, epsilon-Lys, glutatión [6]
5/04	. . conteniendo sólo enlaces peptídicos normales [4]
5/06	. . Dipéptidos [4]

5/062	. . . la cadena lateral del primer aminoácido es acíclica, p. ej. Gly, Ala [6]
5/065	. . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene carbociclos, p. ej. Phe, Tyr [6]
5/068	. . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos amino que grupos carboxilo, o sus derivados, p. ej. Lys, Arg [6]
5/072	. . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos carboxilo que grupos amino, o sus derivados, p. ej. Asp, Glu, Asn [6]
5/075	. . . . Asp-Phe; Sus derivados, p. ej. aspartamo [6]
5/078	. . . el primer aminoácido es heterocíclico, p. ej. Pro, His, Trp [6]
5/08	. . Tripéptidos [4]
5/083	. . . la cadena lateral del primer aminoácido es acíclica, p. ej. Gly, Ala [6]
5/087	. . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene carbociclos, p. ej. Phe, Tyr [6]
5/09	. . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos amino que grupos carboxilo, o sus derivados, p. ej. Lys, Arg [6]
5/093	. . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos carboxilo que grupos amino, o sus derivados, p. ej. Asp, Glu, Asn [6]
5/097	. . . el primer aminoácido es heterocíclico, p. ej. Pro, His, Trp, p. ej. tiroliberina, melanostatina [6]
5/10	. . Tretapéptidos [4]
5/103	. . . la cadena lateral del primer aminoácido es acíclica, p. ej. Gly, Ala [6]
5/107	. . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene carbociclos, p. ej. Phe, Tyr [6]
5/11	. . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos amino que grupos carboxilo, o sus derivados, p. ej. Lys, Arg [6]
5/113	. . . la cadena lateral del primer aminoácido contiene más grupos carboxilo que grupos amino, o sus derivados, p. ej. Asp, Glu, Asn [6]
5/117	. . . el primer aminoácido es heterocíclico, p. ej. Pro, His, Trp [6]
5/12	. . Péptidos cíclicos [4]
<b>7/00</b>	<b>Péptidos con 5 a 20 aminoácidos en una secuencia totalmente determinada; Sus derivados [4,6]</b>
7/02	. Péptidos lineales que contienen al menos un enlace peptídico anormal [4]
7/04	. Péptidos lineales que contienen solamente enlaces peptídicos normales [4]
7/06	. . con 5 a 11 aminoácidos [4]
7/08	. . con 12 a 20 aminoácidos [4,6]
7/14	. . Angiotensinas; Péptidos semejantes [4]
7/16	. . Oxitocinas; Vasopresinas; Péptidos semejantes [4]
7/18	. . Kalidinas; Bradiquininas; Péptidos semejantes [4]
7/22	. . Eledoisinas; Péptidos semejantes [4]
7/23	. . Hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH); Péptidos semejantes [6]
7/28	. . Gramicidinas A, B, D; Péptidos semejantes [4]
7/50	. . Péptidos cíclicos que contienen al menos un enlace peptídico anormal [4]
7/52	. . conteniendo sólo enlaces peptídicos normales en el ciclo [4]
7/54	. . conteniendo al menos un enlace peptídico anormal en el ciclo [4]
7/56	. . . ciclados de forma distinta que por el ácido diamino-2,4 butanoico [4]
7/58	. . . . Bacitracinas; Péptidos semejantes [4]

7/60	. . . ciclados por el grupo amino-4 del ácido diamino-2,4 butanoico [4]
7/62	. . . . Polimixinas; Péptidos semejantes [4]
7/64	. Péptidos cíclicos que contienen solamente enlaces peptídicos normales [4]
7/66	. . Gramicidinas S, C; Tirocidinas A, B, C; Péptidos semejantes [4]
<b>9/00</b>	<b>Péptidos de hasta 20 aminoácidos, que contienen radicales sacáridos y una secuencia totalmente determinada; Sus derivados [4,6]</b>
<b>11/00</b>	<b>Depsipéptidos que contienen hasta 20 aminoácidos en una secuencia totalmente determinada; Sus derivados [4,6]</b>
11/02	. cíclicos, p. ej. valinomicinas [4]
<b>14/00</b>	<b>Péptidos con más de 20 aminoácidos; Gastrinas; Somatostatinas; Melanotropinas; Sus derivados [6]</b>
14/005	. de origen vírico [6]
14/01	. . virus ADN [6]
14/015	. . . Parvoviridae, p. ej. virus de la panleucopenia felina, parvovirus humano [6]
14/02	. . . Hepadnaviridae, p. ej. virus de la hepatitis B [6]
14/025	. . . Papovaviridae, p. ej. virus de papiloma, virus del polioma, SV40, virus BK, virus JC [6]
14/03	. . . Herpetoviridae, p. ej. virus de la pseudorrabia [6]
14/035	. . . . Virus herpes simple I o II [6]
14/04	. . . . Herpesvirus varicellae [6]
14/045	. . . . Citomegalovirus [6]
14/05	. . . . Virus Epstein-Barr [6]
14/055	. . . . Virus de la enfermedad de Marek [6]
14/06	. . . . Virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina [6]
14/065	. . . Poxviridae, p. ej. avipoxvirus [6]
14/07	. . . . Virus de la vacuna; Virus de la viruela [6]
14/075	. . . Adenoviridae [6]
14/08	. . Virus ARN [6]
14/085	. . . Picornaviridae, p. ej. virus Cocksackie, ecovirus, enterovirus [6]
14/09	. . . . Virus de la fiebre aftosa [6]
14/095	. . . . Rhinovirus [6]
14/10	. . . . Virus de la hepatitis A [6]
14/105	. . . . Virus de la poliomeilitis [6]
14/11	. . . Orthomyxoviridae, p. ej. virus de la influenza [6]
14/115	. . . Paramyxoviridae, p. ej. virus de la parainfluenza [6]
14/12	. . . . Virus de la parotiditis; Virus del sarampión [6]
14/125	. . . . Virus de la enfermedad de Newcastle [6]
14/13	. . . . Virus del moquillo canino [6]
14/135	. . . . Virus respiratorio sincitial [6]
14/14	. . . Reoviridae, p. ej. rotavirus, virus de la lengua azul de la oveja, virus de la fiebre de garrapatas del Colorado [6]
14/145	. . . Rhabdoviridae, p. ej. virus de la rabia, virus Duvenhage, virus Mokda, virus de la estomatitis vesicular [6]
14/15	. . . Retroviridae, p. ej. virus de la leucemia bovina, virus de la leucemia felina, virus linfotrópico de células T humanas [6]
14/155	. . . . Lentiviridae, p. ej. virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus visnomaedi, virus de la anemia infecciosa equina [6]

14/16	. . . . . VIH-1 [6]
14/165	. . . . Coronaviridae, p. ej. virus de la bronquitis infecciosa aviar [6]
14/17	. . . . Virus de la gastroenteritis transmisible del cerdo [6]
14/175	. . . . Bunyaviridae, p. ej. virus de la encefalitis californiana, virus de la fiebre del Rift Valley, virus Hantaan [6]
14/18	. . . . Togaviridae, p. ej. Flavivirus, virus de la peste, virus de la fiebre amarilla, virus de la hepatitis C, virus de la encefalitis japonesa [6]
14/185	. . . . Virus de la peste porcina [6]
14/19	. . . . Virus de la rubeola [6]
14/195	. de origen bacteriano [6]

### Nota

En los grupos C07K 14/20 Hasta C07K 14/365, después del nombre de la bacteria se indica entre paréntesis, en su caso, el orden (O), la familia (F) o el género (G). [6]

14/20	. . de Spirochaetales (O), p. ej. Treponema, Leptospira [6]
14/205	. . de Campylobacter (G) [6]
14/21	. . de Pseudomonadaceae (F) [6]
14/215	. . de Halobacteriaceae (F) [6]
14/22	. . de Neisseriaceae (F), p. ej. Acinetobacter [6]
14/225	. . de Alcaligenes (G) [6]
14/23	. . de Brucella (G) [6]
14/235	. . de Bordetella (G) [6]
14/24	. . de Enterobacteriaceae (F), p. ej. Citrobacter, Serratia, Proteus, Providencia, Morganella, Yersinia [6]
14/245	. . . Escherichia (G) [6]
14/25	. . . Shigella (G) [6]
14/255	. . . Salmonella (G) [6]
14/26	. . . Klebsiella (G) [6]
14/265	. . . Enterobacter (G) [6]
14/27	. . . Erwinia (G) [6]
14/275	. . . Hafnia (G) [6]
14/28	. . de Vibrionaceae (F) [6]
14/285	. . de Pasteurellaceae (F), p. ej. Haemophilus influenza [6]
14/29	. . de Rickettsiales (O) [6]
14/295	. . de Chlamydiales (O) [6]
14/30	. . de Mycoplasmatales, p. ej. microorganismos del tipo Pleuropneumonia (PPLO) [6]
14/305	. . de Micrococcaceae (F) [6]
14/31	. . . de Staphylococcus (G) [6]
14/315	. . de Streptococcus (G), p. ej. Enterococci [6]
14/32	. . de Bacillus (G) [6]
14/325	. . . Péptido cristalino de Bacillus thuringiensis (delta-endotoxina) [6]
14/33	. . de Clostridium (G) [6]
14/335	. . de Lactobacillus (G) [6]
14/34	. . de Corynebacterium (G) [6]
14/345	. . de Brevibacterium (G) [6]
14/35	. . de Mycobacteriaceae (F) [6]
14/355	. . de Nocardia (G) [6]
14/36	. . de Actinomyces; de Streptomyces (G) [6]
14/365	. . de Actinoplanes (G) [6]
14/37	. de hongos [6]
14/375	. . de Basidiomycetes [6]
14/38	. . de Aspergillus [6]
14/385	. . de Penicillium [6]

- 14/39 . . de levaduras [6]
- 14/395 . . . de Saccharomyces [6]
- 14/40 . . . de Candida [6]
- 14/405 . de algas [6]
- 14/41 . de líquenes [6]
- 14/415 . de vegetales [6]
- 14/42 . . Lectinas, p. ej. concanavalina, fitohemaglutinina [6]
- 14/425 . . Zeínas [6]
- 14/43 . . Taumatina [6]
- 14/435 . de animales; de humanos [6]
- 14/44 . . de protozoos [6]
- 14/445 . . . Plasmodium [6]
- 14/45 . . . Toxoplasma [6]
- 14/455 . . . Eimeria [6]
- 14/46 . . de vertebrados [6]
- 14/465 . . . de aves [6]
- 14/47 . . . de mamíferos [6]
- 14/475 . Factores de crecimiento; Reguladores de crecimiento [6]
- 14/48 . . . Factor de crecimiento de tejido nervioso (NGF) [6]
- 14/485 . . . Factor de crecimiento epidérmico (EGF) (urogastrona) [6]
- 14/49 . . . Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) [6]
- 14/495 . . . Factor de crecimiento transformante (TGF) [6]
- 14/50 . . . Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) [6]
- 14/505 . . . Eritropoyetina (EPO) [6]
- 14/51 . . . Factor morfogénico óseo; Osteogenina; Factor osteogénico; Factor óseoinductor [6]
- 14/515 . . . Factor angiogénico; Angiogenina [6]
- 14/52 . . Citoquinas; Linfoquinas; Interferones [6]
- 14/525 . . . Factor de necrosis tumoral (TNF) [6]
- 14/53 . . . Factor estimulante de colonias (CSF) [6]
- 14/535 . . . . CSF de granulocitos; CSF de granulocitos-macrófagos [6]
- 14/54 . . . Interleuquinas (IL) [6]
- 14/545 . . . . IL-1 [6]
- 14/55 . . . . IL-2 [6]
- 14/555 . . . Interferones (IFN) [6]
- 14/56 . . . . IFN alfa [6]
- 14/565 . . . . IFN beta [6]
- 14/57 . . . . IFN gamma [6]
- 14/575 . . Hormonas [6]
- 14/58 . . . Complejo del factor natriurético atrial; Atriopeptina; Péptido natriurético atrial (ANP); Cardionatrina; Cardiodilatina [6]
- 14/585 . . . Calcitoninas [6]
- 14/59 . . . Hormona estimulante del folículo (FSH); Gonadotropinas coriónicas, p. ej. HCG; Hormona luteinizante (LH); Hormona estimulante del tiroides (TSH) [6]
- 14/595 . . . Gastrinas; Colecistoquinas (CCK) [6]
- 14/60 . . . Factor de liberación de la hormona del crecimiento (GH-RF) (Somatoliberina) [6]
- 14/605 . . . Glucagones [6]
- 14/61 . . . Hormona del crecimiento (GH) (Somatotropina) [6]
- 14/615 . . . . Extracción de fuentes naturales [6]
- 14/62 . . . Insulinas [6]
- 14/625 . . . . Extracción de fuentes naturales [6]
- 14/63 . . . Motilinas [6]
- 14/635 . . . Hormona paratiroidea (parathormona); Péptidos relacionados con la hormona paratiroidea [6]
- 14/64 . . . Relaxinas [6]
- 14/645 . . . Secretinas [6]
- 14/65 . . . Factores de crecimiento de tipo insulina (Somatomedinas), p. ej. IGF-1, IGF-2 [6]
- 14/655 . . . Somatostatinas [6]
- 14/66 . . . Timopoiéticas [6]
- 14/665 . . derivadas de pro-opiomelanocortina, pro-enkefalina o pro-dinorfina [6]
- 14/67 . . . Lipotropinas, p. ej. lipotropina beta o gamma [6]
- 14/675 . . . beta-endorfinas [6]
- 14/68 . . . Hormona estimulante de los melanocitos (MSH) [6]
- 14/685 . . . . alfa-melanotropina [6]
- 14/69 . . . . beta-melanotropina [6]
- 14/695 . . . Corticotropina (ACTH) [6]
- 14/70 . . . Encefalinas [6]
- 14/705 . . Receptores; Antígenos celulares de superficie; Determinantes celulares de superficie [6]
- 14/71 . . . para factores de crecimiento; para reguladores de crecimiento [6]
- 14/715 . . . para citoquinas; para linfoquinas; para interferones [6]
- 14/72 . . . para hormonas [6]
- 14/725 . . . receptores de células T [6]
- 14/73 . . . . CD4 [6]
- 14/735 . . . Receptores Fc [6]
- 14/74 . . . Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) [6]
- 14/745 . . Factores de coagulación sanguínea o de fibrinólisis [6]
- 14/75 . . . Fibrinógeno [6]
- 14/755 . . . Factores VIII [6]
- 14/76 . . Albúminas [6]
- 14/765 . . . Seroalbúmina, p. ej. HSA [6]
- 14/77 . . . Ovoalbúmina [6]
- 14/775 . . . Apolipopéptidos [6]
- 14/78 . . Péptidos del tejido conectivo, p. ej. colágeno, elastina, laminina, fibronectina, vitronectina, globulina insoluble en frío (CIG) [6]
- 14/785 . . Péptidos surfactantes alveolares; Péptidos surfactantes pulmonares [6]
- 14/79 . . Transferrinas, p. ej. lactoferrinas, ovotransferrinas [6]
- 14/795 . . Péptidos que contienen anillos de porfirina o corrina [6]
- 14/80 . . Citocromos [6]
- 14/805 . . Hemoglobinas; Mioglobinas [6]
- 14/81 . . Inhibidores de proteasa [6]
- 14/815 . . de sanguijuelas, p. ej. hirudina, eglina [6]
- 14/82 . . Productos de traducción de oncogenes [6]
- 14/825 . . Metalotioneínas [6]
- 16/00 Inmunoglobulinas, p. ej. anticuerpos mono o policlonales [6]**
- 16/02 . del huevo [6]
- 16/04 . de la leche [6]
- 16/06 . del suero [6]
- 16/08 . contra materiales víricos [6]
- 16/10 . . de virus ARN [6]
- 16/12 . contra materiales bacterianos [6]
- 16/14 . contra materiales de hongos, algas o líquenes [6]
- 16/16 . contra materiales vegetales [6]

16/18	· contra materiales animales o humanos [6]	16/44	· contra material no previsto [6]
16/20	· . de protozoos [6]	16/46	· Inmoglobulinas híbridas (híbridos de una inmunoglobulina con un péptido distinto de una inmunoglobulina C07K 19/00) [6]
16/22	· . contra factores de crecimiento [6]		
16/24	· . contra citoquinas, linfoquinas o interferones [6]	17/00	<b>Péptidos fijados sobre un soporte o inmovilizados; Su preparación [4]</b>
16/26	· . contra hormonas [6]	17/02	· Péptidos inmovilizados, o en, un soporte orgánico [4]
16/28	· . contra receptores, antígenos celulares de superficie o determinantes celulares de superficie [6]	17/04	· . encerrados en el interior del soporte, p. ej. en un gel, en una fibra hueca [4]
16/30	· . . de células tumorales [6]	17/06	· . unidos al soporte <u>por medio de</u> un agente de unión [4]
16/32	· . contra productos de traducción de oncogenes [6]	17/08	· . siendo el soporte un polímero sintético [4]
16/34	· . contra antígenos de grupo sanguíneo [6]	17/10	· . siendo el soporte un hidrato de carbono [4]
16/36	· . contra factores de coagulación sanguínea [6]	17/12	· . . Celulosa o sus derivados [4]
16/38	· contra inhibidores de proteasa de estructura peptídica [6]	17/14	· Péptidos inmovilizados sobre, o en, un soporte inorgánico [4]
16/40	· contra enzimas [6]		
16/42	· contra inmunoglobulinas (anticuerpos anti-idiotípicos) [6]	19/00	<b>Péptidos híbridos</b> (Inmoglobulinas híbridas compuestas solamente de inmoglobulinas C07K 16/46) [6]